

# ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK

(2011. július 1-től)

7488* Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint .....	1
7489* Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint .....	3
7539* Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint .....	5

## 7488\* Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama	:	8 [nap]
Protokollok közti szünet	:	6 [nap]
Fázisok száma	:	2

### Megjegyzés:

Metasztázist adó kolorektális tumor elsővonalas kezelésére nem műthető, de potenciónálisán műthetővé tehető máj metastázis esetén. Csak bizonyított EGFR pozitivitás és vad típusú K-RAS esetén alkalmazható!

### Kemoterápia:

1. nap	Cetuximab	400 mg/m <sup>2</sup> iv. inf. (első alkalommal 120 perc alatt).
	Oxaliplatin	100 mg/m <sup>2</sup> inf. 2 óra alatt
	Ca-folinate	400 mg/m <sup>2</sup> i.v. inf. 2 óra alatt
	5FU	400 mg/m <sup>2</sup> a Ca-folinate után bolus inj.
	5FU	3 x 800 mg/m <sup>2</sup> i.v. inf. 46 óra alatt
8. nap	Cetuximab	250 mg/m <sup>2</sup> iv. inf. 60 perc alatt.

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis ( alapbetegség)

- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata



## 7489\* Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 8 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 6 [nap]  
**Fázisok száma** : 2

### Megjegyzés:

Metasztázist adó kolorektális tumor elsővonalas kezelésére nem műthető, de potenciónalisán műthetővé tehető máj metasztázis esetén. Csak bizonyított EGFR pozitivitás és vad típusú K-RAS esetén alkalmazható!

### Kemoterápia:

1. nap	Cetuximab	250 mg/m <sup>2</sup> iv. inf. (első alkalommal 120 perc alatt).
	Oxaliplatin	100 mg/m <sup>2</sup> inf. 2 óra alatt
	Ca-folinate	400 mg/m <sup>2</sup> i.v. inf. 2 óra alatt
	5FU	400 mg/m <sup>2</sup> a Ca-folinate után bolus inj.
	5FU	3 x 800 mg/m <sup>2</sup> i.v. inf. 46 óra alatt
8. nap	Cetuximab	250 mg/m <sup>2</sup> iv. inf. 60 perc alatt.

### Diagnózisok:

#### 1-es típusú diagnózis ( alapbetegség)

- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

#### 3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

- C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata  
 C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata  
 C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

**Fázisok leírása:**

**Beavatkozás kód: 74891 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]**

5FU	Fluorouracyl	<b>Adagolás:</b>	400,0	mg/m2 (iv. bolus)
5FU	Fluorouracyl	<b>Adagolás:</b>	800,0	mg/m2
CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0	mg/m2
FOLINAC	Calcium folinate	<b>Adagolás:</b>	400,0	mg/m2
OXALI	Oxaliplatin	<b>Adagolás:</b>	100,0	mg/m2

**Beavatkozás kód: 74892 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**

CETUX	Cetuximab	<b>Adagolás:</b>	250,0	mg/m2
-------	-----------	------------------	-------	-------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1					2
5FU	Fluorouracyl	*							
5FU	Fluorouracyl	*	*	*					
CETUX	Cetuximab	*							*
FOLINAC	Calcium folinate	*							
OXALI	Oxaliplatin	*							

## 7539\* Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint

**Protokoll időtartama** : 15 [nap]  
**Protokollok közti szünet** : 13 [nap]  
**Fázisok száma** : 3

### Megjegyzés:

HER-2 negatív metasztatikus emlőcarcinómában szenvedő betegek elsővonalbeli kezelésére, paclitaxellel kombinálva.

1. és 15. nap bevacizumab 10 mg/kg iv. inf. (első alkalommal 90 perc, 2. alkalommal 60 perc, majd 30 perc alatt).

### Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata  
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata  
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata  
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata  
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata  
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata  
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

### Fázisok leírása:

**Beavatkozás kód: 75391 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (01. fázis)**

**Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]**  
BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 10,0 mg/kg  
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 75392 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (02. fázis)**

**Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]**  
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

**Beavatkozás kód: 75393 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (03. fázis)**

**Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]**  
BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 10,0 mg/kg  
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m<sup>2</sup>

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fázisok:	1							2							3
BEVAC	Bevacizumab	*													*
TAX	Paclitaxel	*						*							*