

## Plerixafor

### Finanszírozott indikáció:

- Lymphomás, myeloma multiplexes felnőtt betegek részére a haemopoeticus őssejteknek a perifériás vérbe történő mobilizációjának elősegítésére a levétel és az azt követő autológ transzplantáció céljából abban az esetben, ha a betegek nehezen vagy rosszul mobilizálnak (kemoterápia+G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél 10 G/l fölé emelkedett fvs szám ellenére a perifériás CD34+ sejtszáma az 5-20/ul tartományban marad vagy G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél a mobilizálás 5. napján a perifériás vér CD34+ sejtszáma még mindig az 5-20/ul tartományban van) G-CSF-ral együtt alkalmazva.

### Jogosult intézményi kör:

0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest  
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ  
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc  
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ  
0940 Debreceni Egyetem Klinikai Központ