

Rituximab

Finanszírozott indikációk:

1. [Súlyos rheumatoid arthritis](#) kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken (aktivitási index csökkenés kevesebb, mint 1,2), a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.
2. [B-sejtes krónikus lymphoid leukemia](#) korai (RAI 0-II) stádiumában, amennyiben az aktivitási jelek közül legalább egy jelen van: B-tünet, 6 hónapon belül megkettőződő lymphocytaszám, progresszív splenomegalia (a bal bordaívét 6 cm-rel meghaladó lép/progresszív lymphadenomegalia /legnagyobb nyirokcsomó átmérője > 10 cm), csontvelőelégtelenség, valamint előrehaladott stádiumú (RAI III-IV) betegek részére, akik az ECOG skálán 0-2 értékkel rendelkeznek, első vonalbeli R- kombinációs kemoterápia részeként, összesen 6 cikluson keresztül.
3. [III-IV. stádiumú folliculáris lymphoma](#) indukciós és fenntartó kezelése, első vonalban és relapszus esetén, valamint CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelése.
4. [Kemoterápiával kombinálva javasolt relapszusos/refrakter krónikus lymphocytás leukémiában](#) szenvedő betegek kezelésére, összesen 6 cikluson keresztül.

[Ugrás a dokumentum elejére](#)

- 1. Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken (aktivitási index csökkenés kevesebb, mint 1,2), a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.**

Jogosult intézményi kör:

0153 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0901 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
0940 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
1102 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
1901 Csolnoky Ferenc Kórház
2004 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
2237 Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest
9521 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

[Ugrás a dokumentum elejére](#)

2. **B-sejtes krónikus lymphoid leukemia korai (RAI 0-II) stádiumában, amennyiben az aktivitási jelek közül legalább egy jelen van: B-tünet, 6 hónapon belül megkettőződő lymphocytaszám, progresszív splenomegalia (a bal bordaívet 6 cm-rel meghaladó lép/progresszív lymphadenomegalia /legnagyobb nyirokcsomó átmérője > 10 cm), csontvelőelégtelenség, valamint előrehaladott stádiumú (RAI III-IV) betegek részére, akik az ECOG skálán 0-2 értékkel rendelkeznek, első vonalbeli R- kombinációs kemoterápia részeként, összesen 6 cikluson keresztül.**

Jogosult intézményi kör:

0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
1901 Csolnoky Ferenc Kórház
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

[Ugrás a dokumentum elejére](#)

3. III-IV. stádiumú folliculáris lymphoma indukciós és fenntartó kezelése, első vonalban és relapszus esetén, valamint CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelése.

Jogosult intézményi kör:

0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
1901 Csolnoky Ferenc Kórház
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

[Ugrás a dokumentum elejére](#)

4. Kemoterápiával kombinálva javasolt relapszusos/refrakter krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő betegek kezelésére, összesen 6 cikluson keresztül.

Jogosult intézményi kör:

0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
1901 Csolnoky Ferenc Kórház
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

[Ugrás a dokumentum elejére](#)